

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -2-6-71 182365

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 4 au Bulletin n° 128 du mois de Mai

26 Mai 1971

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Les premières taches de Tavelure sont apparues le 15 Mai dans certains vergers insuffisamment protégés, notamment dans la région de WISSEMBOURG (67).

La projection des ascospores dans les périthèces (organes de conservation du champignon) n'est pas encore terminée. La période pluvieuse que nous traversons va accélérer les dernières projections qui devraient se terminer dans la première décade du mois de Juin.

Afin d'éviter tous risques de contaminations primaires dans les vergers indemnes de tache, nous conseillons de renouveler le traitement contre la Tavelure dès réception de la présente Note.

Dans les vergers contaminés, choisir un produit ayant une action curative.

OIDIUM DU POMMIER

Dans les vergers où l'Oïdium est observé, ajouter un anti-Oïdium à la bouillie Tavelure.

Traiter avec beaucoup de soin en apportant suffisamment de bouillie.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les premiers vols en cages d'élevage ont été observés entre le 7 et le 10 Mai, selon les situations et plus tardivement dans le département de la MEUSE.

Les premières pontes sous manchons de contrôle, notées le 15 Mai, sont en voie d'éclosion. En conséquence, un premier traitement est à envisager dès à présent. On opérera en traitement mixte (Tavelure - Carpocapse).

Pour le choix du produit, se référer à la liste en votre possession.

Attendre un nouvel avis de la Station pour intervenir dans les vergers implantés dans le département de la MEUSE.

TOUTES ESSENCES

PUCERONS

Des colonies de Pucerons sont présentes sur de nombreuses essences fruitières (Pucerons noirs sur cerisiers, Pucerons verts et mauves sur pommiers, Pucerons verts sur pruniers). Intervenir en cas de nécessité.

En ce qui concerne le cerisier, tenir compte des délais d'emploi avant la récolte.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 3 au Bulletin n° 128 publié en date du 21 Mai 1971